

TURUNAN FUNGSI

Misal diberikan grafik fungsi $y = f(x)$ dengan $P (a, b)$ terletak pada kurva $f(x)$. Bila $Q (x,y)$ merupakan titik sembarang pada kurva $f(x)$ maka gradien garis PQ dapat dinyatakan dengan :

$$m_{PQ} = \frac{y-b}{x-a} = \frac{f(x) - f(a)}{x-a}$$

Bila titik Q berimpit dengan dengan titik P maka garis PQ akan merupakan garis singgung kurva $f(x)$ di P sehingga gradien :

$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a}$$

Turunan dari fungsi $f(x)$ di titik $x = a$ didefinisikan sebagai gradien dari garis singgung kurva $f(x)$ di $x = a$ dan diberikan:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a}$$

Bila nilai limit ada maka $f(x)$ dikatakan **diferensiabel** atau **dapat diturunkan** di $x = a$.

Misal $h = x - a$. Maka turunan $f(x)$ di $x = a$ dapat dituliskan :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Notasi lain : $f'(a) = \frac{df(a)}{dx} = \frac{dy(a)}{dx} = y'(a)$

Secara fisis, pengertian dari turunan fungsi $f(x)$ di titik $x = a$ dinyatakan sebagai kecepatan, $V(x)$ benda yang bergerak dengan lintasan $f(x)$ pada saat $x = a$. Oleh karena itu, didapatkan hubungan $V(a) = f'(a)$ dan percepatan , $A(x)$, $A(a) = \frac{dV(a)}{dx}$

Bila $y = f(x)$ diferensiabel di $x = a$ maka kontinu di $x = a$. Sifat tersebut tidak berlaku sebaliknya. Hal ini, ditunjukkan oleh contoh berikut.

Contoh

Tunjukkan bahwa $f(x) = |x|$ kontinu di $x = 0$ tetapi tidak diferensiabel di $x = 0$

Jawab :

Fungsi $f(x)$ kontinu di $x = 0$, sebab $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

Turunan $f(x)$ di $x = 0$ dicari menggunakan rumus berikut :

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$$

Karena $-1 = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} \neq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1$ maka $f(x) = |x|$ tidak diferensiabel di $x = 0$.

Untuk menentukan turunan suatu fungsi diberikan rumus sebagai berikut :

$$1. \frac{d(x^r)}{dx} = r x^{r-1} \quad ; \quad r \in R$$

$$2. \frac{d(f(x) + g(x))}{dx} = \frac{d(f(x))}{dx} + \frac{d(g(x))}{dx}$$

$$3. \frac{d(f(x) g(x))}{dx} = g(x) \frac{d(f(x))}{dx} + f(x) \frac{d(g(x))}{dx}$$

$$4. \frac{d\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)}{dx} = \frac{g(x)d(f(x)) - f(x)d(g(x))}{g^2(x)}$$

Soal latihan

(Nomor 1 sd 10) Tentukan $\frac{dy}{dx}$ dari :

$$1. y = \frac{-12}{2x^6}$$

$$2. y = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$$

$$3. y = x(x^2 + 1)$$

$$4. y = (x^4 + 2x)(x^3 + 2x^2 + 1)$$

$$5. y = (3x^2 + 2x)(x^4 - 3x + 1)$$

$$6. y = \frac{1}{3x^2 + 9}$$

$$7. y = \frac{2x - 1}{x - 1}$$

$$8. y = \frac{2x^2 - 3x + 1}{2x + 1}$$

$$9. y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x^2 + 2x - 3}$$

$$10. y = \frac{5x^2 + 2x + 6}{3x - 1}$$

(Nomor 11 sd 13) Tentukan nilai a dan b agar fungsi berikut diferensiabel di nilai yang diberikan.

$$11. f(x) = \begin{cases} a\sqrt{x+3} & ; 0 \leq x < 1 \\ x^2 - bx & ; x \geq 1 \end{cases} \quad ; x = 1$$

$$12. f(x) = \begin{cases} ax - b & ; x < 2 \\ 2x^2 - 1 & ; x \geq 2 \end{cases} \quad ; x = 2$$

$$13. f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & ; x < 3 \\ 2ax + b & ; x \geq 3 \end{cases} \quad ; x = 3$$